

Ce que les mésanges nous disent du dérèglement climatique


Histoires de nichoirs



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
HAUTE-SAVOIE

Les nichoirs

Premiers nichoirs au
16^{ème} siècle en
Flandres
Très en vogue dès le
19^{ème} siècle à l'est de
l'Europe
Obligatoire dans les
fermes polonaises en
1920



Modèle de nichoir à fabriquer LPO 1923

Substitut de cavités naturelles



Grands cavicoles



Favoriser les petits oiseaux **cavicoles** insectivores



Oiseaux sédentaires

Cavicoles migrants



Les locataires presque exclusifs





Photo Yann Peyraud

28 ans c'est long...



Après 15 à 20 ans de bons et loyaux services



Remplacement par des nichoirs en béton de bois



Pose des niohirs



100 m entre les niohirs destinés aux mêmes espèces

Visite des niohoirs



3 visites
annuelles pour
les
Oiseaux

5 pour les
chiroptères





Protocole Perret

Suivi du nid et de la nichée

Construction du nid :

La construction du nid peut prendre de 1 à 15 jours.

Noter le stade de construction :

Stade 1 : jusqu'à 10 brins de mousse.

Stade 2 : le fond du nichoir est recouvert de mousse (évaluer la hauteur en cm)

Stade 3 : le fond du nichoir est visible, la mousse est distribuée en couronne,

Stade 4 : le nid est fait de mousse uniquement.

Stade 5 : le nid est prêt, avec de la bourre.

Mesurer la hauteur **avec une règle**. Une mesure approximative n'a aucune signification !



10 brins de mousse
Stade 1



Fond de mousse
Stade 2



Nid sans bourre
Stade 4



Nid prêt
Stade 5

20/04/2022

5 jours :

Les fourreaux des grandes couvertures sont développés alors que ceux des tectrices sont à peine visibles. Le tarse est assez développé pour que le poussin puisse être bagué. Pour baguer il faut une **autorisation personnelle** délivrée par le Muséum National d'Histoire Naturelle.



5 jours



5 jours

6 jours :

Les fourreaux des couvertures moyennes sont apparents. Les yeux peuvent s'ouvrir au 1/3.



7 jours :

Les tectrices recouvrent juste la moitié des rémiges primaires.




8 jours :

Petits plumeaux blanc gris au bout des grandes couvertures.



9 jours :

Petits plumeaux blanc gris au bout des rémiges secondaires.





20/04/2022

les nichoirs du SIV


Carte des parcs de nichoirs

•





Le Dauzet
700m (30)



Les Baraques


860m (30)



Le Golet du Pet


860m (40)

Les paysages des parcs de nichoirs



Résultats du nombre de jeunes sur le Vuache durant 28 années

	nombre de jeunes
mésange charbonnière	4878
mésange bleue	2396
mésange noire	1777
TOTAL	9051



Les dates d'envol des mésanges bleues sur le Vuache

date d'envol au SIV




31-05

26%

11j .

date d'envol mésange charbonnière



date d'envol des mésanges noires



31-
05

26%


11
jours

— date d'envol
— Linéaire (date d'envol)


Comparaison à des altitudes plus basses: 500m



date envol à Eloise




date d'envol à la CCUR



Entre 5 et 7j de progression
48%
23/05 date moyenne d'envol

date envol à Eloise




— date envol
— Linéaire (date envol)

Entre 22 et
23/05

44%

date d'envol à la CCUR




— date d'envol
— Linéaire (date d'envol)


Entre 1 et
6jours

Comparaison à des altitudes plus basses: 300m

date d'envol au bord du Rhône



date d'envol au bord du Rhône



20/05
56%
1 journée



21/05 38% 5 jours

Autre utilisation d'un nichoir



MERCI

